

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗਾਈਡ

A HEALTH GUIDE FOR PATIENTS AFTER TRANSPLANTATION

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੱਤਕਰਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ.....	1
ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ	2
ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ.....	3
ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ.....	6
ਘਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ	7
Tacrolimus [tak-row-lim-us]	8
Mycophenolate [my-ko-fen-o-late]	11
Prednisone, Prednisolone, Methylprednisolone	13
ਅਸਵੀਕਾਰ/ਰੱਦ ਕਰਨਾ	15
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਦਵਾਈਆਂ	17
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ.....	18
ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ	20
ਫੰਗਲ ਇਨੈਕਸ਼ਨ	21
Sulfamethoxazole/Trimethoprim.....	22
ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ	24
Valganciclovir	25
Valacyclovir	27
ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ.....	28
ਨੇਚੁਰੋਪੈਥਿਕ, ਹਰਬਲ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਂ ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਪਦਾਰਥ	30
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ.....	32
ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ.....	34

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ

PHARMACIES IN BC

ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਫਾਰਮੇਸੀ	ਪਤਾ (ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ)	ਫੋਨ ਨੰਬਰ
Newgen Pharmachoice	100-1945 McCallum Road Abbotsford BC V2S 3N4	604-859-2351
Kipp-Mallery Pharmacy	273 Victoria Street Kamloops BC V2C 2A1	250-372-2531
Lakeside Clinical Pharmacy	112A - 2365 Gordon Avenue Kelowna BC V1W 3C2	250-860-3100
Wellness Pharmacy #2	#104-22314 Fraser Hwy Langley , BC V3A 8M6	604-530-5300
Central Drugs	Unit #16 2220 Bowen Road Nanaimo BC V9S 1H9	250-758-7711
City Centre Pharmacy	101-399 Main Street Penticton , BC, V2A 5B7	250-770-0047
London Drugs Pharmacy	#196 - 1600 15th Avenue Prince George BC V2L 3X3	250-561-1118
Somerset Medical Centre Pharmacy	#7 - 13791 72nd Avenue Surrey BC V3W 9Y9	604-590-5587
Shoppers Drug Mart # 271	#271 - 1305 Cedar Street Trail BC V1R 4C3	250-368-3343
Ambulatory Care Pharmacy BC Children's Hospital	4480 Oak Street Vancouver BC V6H 3V5	604-875-2205
Ambulatory Pharmacy St. Paul's Hospital	1081 Burrard Street Vancouver BC V6Z 1Y6	604-806-8151
Solid Organ Transplant Pharmacy Gordon & Leslie Diamond Centre Vancouver General Hospital	5 th Level, 2775 Laurel Street Vancouver BC V5Z 1M9	604-875-5692
Royal Jubilee Prescriptions Royal Jubilee Hospital	DT1200-1952 Bay Street Victoria BC V8R 1J8	250-370-8153

ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ

MEDICATION GUIDE

ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

GENERAL MEDICATION INFORMATION

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Before discharge from the hospital

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ:

- ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ
- ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
- ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ)।

ਦਵਾਈਆਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀਆਂ Ordering Medications

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ।

ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਛੋਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਆਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। (ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ)

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ Medication cost

ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਇਸਿਉਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ/ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਮਾਕੇਅਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੈਂਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ:
<https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents/who-we-cover/fair-pharmacare-plan>। ਇਹ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਛੋਨ ਕਰੋ (604) 683-7151 (ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ) ਜਾਂ 1-800-663-7100 (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ)।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ (PRA) ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਭਾਈਵਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ):

ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ
ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ/ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ	Azathioprine Cyclosporine Mycophenolate Prednisone and Prednisolone Sirolimus Tacrolimus
ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ	Adefovir Entecavir Lamivudine Leflunomide Letermovir Tenofovir Valganciclovir
ਐਰੀਵਰੋਸਾਈਟ (ਖੂਨ ਦੇ ਲਾਲ ਕਣ) ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ	Epoetin alfa Darbepoetin
ਗੈਨੂਲੋਸਾਈਟ (ਖੂਨ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਣ) ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ	Filgrastim (G-CSF)

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਯਸਦੰਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਨੋਟ: ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ- ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।)

ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ How to Take Your Medications

ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਸਕਰ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਚੁਰੋਪੈਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰ ਲਵੇ।

ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੁਰਾਕ Missed Doses

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੁਰਾਕ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਮੁਰਾਕ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆਂ ਅਗਲੀ ਮੁਰਾਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੁਰਾਕ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਵੇ। ਦੂਣੀ ਮੁਰਾਕ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀਆਂ Storage

ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂਮ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚ ਨਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ।

ਗਰਭ Pregnancy

ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਰਭਪਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਓ।

ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ

ANTI-REJECTION MEDICATIONS

ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਇਮੀਊਨ ਸਿਸਟਮ) ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਨੂੰ “ਬਾਹਰਲਾ ਹਮਲਾਆਵਰ” ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇੱਕਸਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਅਤੇ ਲੇਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਕਦੇ ਨਾ ਬਦਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ।

ਕਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਚੁਰੋਪੈਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਪਦਾਰਥ (ਜਿਵੇਂ ਹਰਬਲ ਦਵਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ) ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚੈਕ ਕਰ ਲੈਣ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਪਫਲੂਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਪਫਲੂਟ ਜੂਸ, ਪੋਮੇਲੋ ਜਾਂ ਸੇਵੀਲ ਸੰਤਰਾ/ਜੂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

ਘਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

MEDICATION SAFETY PRECAUTIONS AT HOME

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਘਰ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: **ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ (tacrolimus)**, **ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰੀਨ (cyclosporine)**, **ਮਾਈਕੋਫੋਨੋਲੋਟ (mycophenolate)**, **ਅਜਾਥੀਓਪ੍ਰੈਨ (azathioprine)**, **ਸਿਰੋਲਿਮਸ (sirolimus)** ਜਾਂ **ਵਲਗਨਿਸੀਕਲੋਵੀਰ (valganciclovir)** /

ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਲਈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨ, ਬੁੱਕ/ਰਾਲ, ਪਸੀਨਾ, ਉਲਟੀ, ਵੀਰਜ, ਯੋਨੀ ਦੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

- ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬੂਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਫਲੋਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਟ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿਟੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਣ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ, ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ **ਕਾਫ਼ੀ** ਜੰਮ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ। ਦਸਤਾਨੇ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ, ਵੱਖਰੇ ਬੈਗ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਲਾਂਡਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲਾਂਡਰੀ ਲੋਡ ਵਿਚ ਧੋਵੋ।
- ਕੁੜ੍ਹਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਬੈਗ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਬੈਗ ਵਿਚ ਪਾਓ।
- ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਹਾਂ ਨੂੰ ਢੂਸਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਕਟਲਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
- ਆਮ ਸੰਪਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਫੀ ਪਾਊਣਾ, ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
- ਕਾਮੁਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਵੀਰਜ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਤੇ ਤਰਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿੱਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੇਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੌਡਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ।
- ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਮਾਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣ। ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਗਰਭ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮਰਦ ਮਰੀਜ਼ ਇਮਿਊਨੋਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
- ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟੋ।

ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

TACROLIMUS [TAK-ROW-LIM-US]

ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ


ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦੇ 4 ਬਰਾਂਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮੀਊਨਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨੂੰ ਰਦ/ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

ਪਰੋਗਰਾਫ਼® - ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਿਨ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਲੈਣੀ

ਪਰੋਗਰਾਫ਼ 0.5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਪਰੋਗਰਾਫ਼ 1 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਪਰੋਗਰਾਫ਼ 5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ
 (ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਕੈਪਸੂਲ)	 (ਚਿੱਟਾ ਕੈਪਸੂਲ)	 (ਗੁਲਾਬੀ ਕੈਪਸੂਲ)

ਸੈਂਡੋਜ਼ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ®-ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਿਨ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਲੈਣੀ

ਸੈਂਡੋਜ਼ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ 0.5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਸੈਂਡੋਜ਼ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ 1 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਸੈਂਡੋਜ਼ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ 5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ
 (ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਕੈਪਸੂਲ)	 (ਚਿੱਟਾ ਕੈਪਸੂਲ)	 (ਗੁਲਾਬੀ ਕੈਪਸੂਲ)

ਐਡਵਾਗਰਾਫ਼® - ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਿਨ ਵਿਚ 1 ਵਾਰ ਲੈਣੀ

ਐਡਵਾਗਰਾਫ਼ 0.5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਐਡਵਾਗਰਾਫ਼ 1 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਐਡਵਾਗਰਾਫ਼ 3 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਐਡਵਾਗਰਾਫ਼ 5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ
 (ਸੰਤਰੀ- ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਕੈਪਸੂਲ)	 (ਸੰਤਰੀ- ਚਿੱਟਾ ਕੈਪਸੂਲ)	 (ਸੰਤਰੀ- ਸੰਤਰੀ ਕੈਪਸੂਲ)	 (ਸੰਤਰੀ- ਗੁਲਾਬੀ ਕੈਪਸੂਲ)

ਐਨਵਰਸਸ PA® - ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਿਨ ਵਿਚ 1 ਵਾਰ ਲੈਣੀ

ਐਨਵਰਸਸ PA 0.75 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਐਨਵਰਸਸ PA 1 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਐਨਵਰਸਸ PA 4 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ
  (ਚਿੱਟੀ ਗੋਲੀ)	  (ਚਿੱਟੀ ਗੋਲੀ)	  (ਚਿੱਟੀ ਗੋਲੀ)

ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? How should I take this medication?

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਪਰੋਗਰਾਫ਼: ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਵੇ (ਜਿਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਤੀਂ)	ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: _____
ਸੈਂਡੋਜ਼ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ: ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਵੇ (ਜਿਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਤੀਂ)	ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: _____
ਐਡਵਾਗਰਾਫ਼: ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ 1 ਵਾਰ ਲਵੇ (ਜਿਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ)	ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: _____

	ਐਨਵਰਸਸ PA: ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ 1 ਵਾਰ ਲਵੇ (ਜਿਵੇਂ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ)	ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: _____
--	--	--------------------------------

- ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੜ ਬੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਕਸਾਰ ਰਹੋ, ਜੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਲਵੇ।
- ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੇਪਫਲੂਟ ਜਾਂ ਪੋਮੇਲੋ ਜਾਂ ਮੇਵੀਲੇ ਸੰਤਰੇ/ਜੂਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਰੈਗੁਲਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਲੈਬ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕੋ।

ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: Missed Dose or Vomited Dose:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਵੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲਦੂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਵੇ।

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? What are some possible side effects of this medication?

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Side Effect	ਇਲਾਜ Management
ਛਟਕੇ ਲੱਗਣੇ, ਕੰਬਣੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ	ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਹੋਣਾ	ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੈਗੁਲਰਲੀ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਨਾ ਖਾਓ।
ਖੂਨ ਵਿਚ ਸੂਗਰ ਵਧ ਹੋਣੀ	ਬਲੱਡ ਸੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ, ਮੂੰਹ ਸੁਕਣਾ, ਸਾਹ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਜਿਹੀ ਬੋਂ, ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂਗਰ ਰੈਗੁਲਰਲੀ ਚੈਕ ਕਰਨੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ।
ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਲਨ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ	ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪਰੋਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਦਾਸੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਸੌਣ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਅਜੀਬ ਸੁਪਣੇ	ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪਰੋਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਲ ਝੜਣੇ	ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।
ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਚੋਟ ਨਾਲ ਨਜ਼ਿਠਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘਟਨੀ	ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਬੁਖਾਰ, ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ) ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਸੋ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੋਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੜਕਣੇ ਵੱਡੇ।
ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀ	ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਾ ਉੱਚਾ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਛੁੱਚਾ ਹੋਣਾ	ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਦਸੋ।
ਕੈਂਸਰ	ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਕ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।

ਵੈਲਟ ਕਾਰਡ (Wallet card):

 BC TRANSPLANT ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ	<p>ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ਐਡਵਾਗਰਾਫ (ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ਐਨਵਰਸਸ PA (ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹੋ। • ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਂਡ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਰੱਦ/ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। 	<p>Advagraf® – LONG ACTING tacrolimus taken ONCE a day</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Advagraf 0.5 mg (orange- light yellow capsule)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Advagraf 1 mg (orange- white capsule)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Advagraf 3 mg (orange- orange capsule)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Advagraf 5 mg (orange- pink capsule)</td> </tr> </table> <p>Envarsus PA® - LONG ACTING tacrolimus taken ONCE a day</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Envarsus PA 0.75 mg 0.75 TCS (white tablet)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Envarsus PA 1 mg 1 TCS (white tablet)</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">Envarsus PA 4 mg 4 TCS (white tablet)</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ) ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। • ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਛੁੱਨ ਕਰੋ। 	Advagraf 0.5 mg (orange- light yellow capsule)	Advagraf 1 mg (orange- white capsule)	Advagraf 3 mg (orange- orange capsule)	Advagraf 5 mg (orange- pink capsule)	Envarsus PA 0.75 mg 0.75 TCS (white tablet)	Envarsus PA 1 mg 1 TCS (white tablet)	Envarsus PA 4 mg 4 TCS (white tablet)
Advagraf 0.5 mg (orange- light yellow capsule)	Advagraf 1 mg (orange- white capsule)	Advagraf 3 mg (orange- orange capsule)	Advagraf 5 mg (orange- pink capsule)						
Envarsus PA 0.75 mg 0.75 TCS (white tablet)	Envarsus PA 1 mg 1 TCS (white tablet)	Envarsus PA 4 mg 4 TCS (white tablet)							



MYCOPHENOLATE [MY-KO-FEN-O-LATE]

ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ

- ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਮੋਫੇਟਿਲ (ਐਮ.ਐਮ.ਐਂਡ., ਟੇਵਾ-ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ®, ਐਪੋ-ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ®, ਸੈਨਡੋਜ਼-ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ®, ਸੈਲਸੈਪਟ) ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ
- ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਸੋਡੀਅਮ (ਐਪੋ-ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਸੋਡੀਅਮ, ਮਾਈਫੋਰਟਿਕ®) ਗੋਲੀਆਂ
- ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਪੀਣ ਲਈ ਘੋਲ (ਸੈਲਸੈਪਟ®))
 - ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਮੋਫੇਟਿਲ ਅਤੇ ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲਾਉਣਾ।
 - ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਨਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? **What does the medication look like?**

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਮੋਫੇਟਿਲ 250 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਸੋਡੀਅਮ 180 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ
 ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ	 ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਗੋਲ ਗੋਲੀਆਂ

ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਮੋਫੇਟਿਲ 500 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ	ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਸੋਡੀਅਮ 360 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ
 ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੋਲੀ	 ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੋਲੀ

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? **What is this medication for?**

ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮੀਉਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਅੰਗ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? **How should I take this medication?**

ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਸਤਰ ਇਕਸਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਮੋਫੇਟਿਲ ਲਈ: ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਵੇ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਤੀਂ)	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ: _____
ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਸੋਡੀਅਮ ਲਈ: ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਵੇ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਤੀਂ)	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ: _____

- ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਘਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਕਸਾਰ ਰਹੇ ਜੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਵੇ।
- ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੈਲਸੀਅਮ ਦੇ ਸੰਪੂਰਕ ਜਾਂ ਐਂਟਾਈਸਿਡ (ਡਿਓਲ®, ਮਾਲੋਕਸ®, ਵਗੈਰਾ) ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਾਈਸਿਡ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਜਬ ਹੋਣਾ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

- ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿਚ ਐਸਿਡ ਘਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਨਿਟਿਡਿਨ (ਜੈਨਟੈਕ®), ਪੈਂਟੋਪਰੋਜ਼ੋਲ (ਟੈਕਟਾ®) ਵਰੈਰਾ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ।

ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: Missed Dose or Vomited Dose:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਵੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲੂੜੂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਵੋ।

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? What are some possible side effects of this medication?

ਖੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Side Effect	ਇਲਾਜ Management
ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ	ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਦਸਤ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਰ ਦਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰੋਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਮਾਈਕੋਫਿਨੋਲੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ	ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ: <ul style="list-style-type: none"> • ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣ (ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢਾ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਜਾਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ) • ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ (ਰਗੜ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੱਟੀ, ਉਲਟੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਖੂਨ) • ਖੂਨ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ (ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬਕਾਵਟ, ਬੋਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ, ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ) ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਜੁਕਾਮ/ਫਲੂ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੋਵੋ।
ਕੈਂਸਰ	ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਕ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।

Prednisone, PREDNISOLONE, METHYLPREDNISOLONE

ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ, ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ, ਮੀਥਾਈਲਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ

- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਜਾਂ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
- ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੀਣ ਲਈ ਤਰਲ ਅਤੇ ਨਾੜ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? **What does the medication look like?**

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਚਿੱਤਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ 1 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ	ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ ਪੀਨ ਲਈ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ	ਮੀਥਾਈਲਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ- IV
ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ 5 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ 50 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ	ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ ਪੀਣ ਲਈ ਘੋਲ	

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? **What is this medication for?**

ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ, ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ ਅਤੇ ਮੀਥਾਈਲਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਇਡ ਜਾਂ “ਸਟੀਰੋਇਡ” ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ “ਸਟੀਰੋਇਡ” ਕੁਝ ਖ਼ਿਲਾੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? **How should I take this medication?**

ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵੇ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ)	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ: _____
ਦਵਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼:	

- ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿਚ ਗੜ ਬੜ ਘਟ ਹੋਵੇ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਭਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲੈ ਤਾਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
- ਗੰਭੀਰ ਰਿਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ, ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ ਜਾਂ ਮੀਥਾਈਲਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ ਦੀ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਸੂਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖੁਰਾਕ ਅਸਰਦਾਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਾਈ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਰਹੋਗੇ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ।

ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: Missed Dose or Vomited Dose:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਵੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲੂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਵੇ।

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? What are some possible side effects of this medication?

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Side Effect	ਇਲਾਜ Management
ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ ਵਿਚ ਅਲਸਰ	ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਡਨਿਸੋਲੋਨ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਦੂਧ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ (ਰਨੀਟਿਡੀਨ (ਜ਼ੈਨਟਕ®) ਜਾਂ ਪੈਂਟੋਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲ (ਟੈਕਟਾ®)) ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੌਜਸ਼ ਜਾਂ ਬਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ	ਨਮਕੀਨ ਖਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਚੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਬਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਖੁਨ ਵਿਚ ਸੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ	ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਸੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰਤਾ, ਡਰਨਾਹਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ, ਮੂੰਹ ਸੱਕਣਾ, ਸਾਹ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਵਰਗੀ ਗੰਧ ਆਉਣੀ, ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੂਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੂਗਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ।
ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੀ/ ਭਾਰ ਵਧਣਾ	ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਘਟ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕ ਜਿਵੇਂ ਚਿਪਸ, ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਠੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋ।
ਦਵਾਈ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਖੁਰਨੀਆਂ (ਇਸਟੀਓਪਰੋਸਿਸ)	ਕੈਲਸੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ. ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੌਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਛਿੱਲਾ ਮੂਡ, ਸੁਪਣੇ ਆਉਣੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਸਮੇਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ	ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਚਿੱਟਾ ਮੌਤੀਆ, ਕਾਲਾ ਮੌਤੀਆ	ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈਕਅਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਖ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ (ਗੋਲ ਚਿਹਰਾ, ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ, ਖਿਚਾਅ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੂੰਹ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮੁਹਾਸੇ)	ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਘਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਜਖਮ ਆਹਿਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ	ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਂ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।

ਅਸਵੀਕਾਰ/ਰੱਦ ਕਰਨਾ

REJECTION

ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? What is rejection?

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਣਾਲੀ - ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ - ਤੁਹਾਨੂੰ “ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਾਆਵਰਾਂ” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨੂੰ “ਬਾਹਰਲਾ ਹਮਲਾਆਵਰ” ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਲ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਅੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਕਾਰਨ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਿਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

What are the signs of kidney transplant rejection?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਦਸੋ: ।

- ਬੁਖਾਰ (100°F ਜਾਂ 38°C ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ), ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ
- ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਖਣੀ/ ਦਰਦ ਹੋਣੀ
- ਹੱਥਾਂ, ਪਲਕਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਜਿਸ਼
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ
- 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰ ਵਧਣਾ (1-2 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 2-4 ਪੋਂਡ)
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਭੁੱਖ ਘੱਟਣੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ, ਥਕਾਵਟ

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਪਾਚਕ ਗੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

What are the signs of pancreas transplant rejection?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਦਸੋ: ।

- ਬੁਖਾਰ (100°F ਜਾਂ 38°C ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ), ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ
- ਖੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਗਰ ਵਧਣੀ
- ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ
- ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਖਣੀ/ ਦਰਦ ਹੋਣੀ
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਭੁੱਖ ਘੱਟਣੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ, ਥਕਾਵਟ

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

What are the signs of liver transplant rejection?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਦਸੋ:

- ਬੁਖਾਰ (100°F ਜਾਂ 38°C ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ), ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ
- ਪੇਟ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦੁੱਖਣਾ
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਭੁੱਖ ਘੱਟਣੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ, ਥਕਾਵਟ

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

What are the signs of heart transplant rejection?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਦਸੋ:

- ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ
- ਵਰਜਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਣੀ
- ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (2.2 ਪੌਂਡ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ
- ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ
- ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
- ਗਿੱਟਿਆਂ ਕੋਲ ਸੋਜਸ਼
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਭੁੱਖ ਘੱਟਣੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ, ਥਕਾਵਟ

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

What are the signs of lung transplant rejection?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੱਛਣ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਦਸੋ:

- ਬੁਖਾਰ (100°F ਜਾਂ 38°C ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ), ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ
- ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੁੱਖਣੀ
- ਹਲਕੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ
- ਸੁੱਕੀ ਖੰਬ
- ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ
- ਘਰ ਵਿਚ ਸਪਾਇਰੋਮੀਟਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ
- ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ, ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਭੁੱਖ ਘੱਟਣੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ, ਥਕਾਵਟ

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
ਅਤੇ
ਐਂਟੀ-ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਦਵਾਈਆਂ

INFECTION
AND
ANTI-INFECTIVE MEDICATIONS

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

General Information

ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? What is infection?

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀਟਾਣੂ (ਸੂਖਮ ਜੀਵ) ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀਟਾਣੂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ:

- ਬੈਕਟੀਰੀਆ - ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਵਾਇਰਸ - ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਡੰਗਸ (ਉੱਲੀ) - ਇਹ ਡੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਭਰ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ? What are the signs of infection?

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਟਾਣੂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

- ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਦਰਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣਾ
- ਨਵੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ
- ਬੁਖਾਰ, ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ
- ਡਲੂ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਫੁੱਲਣਾ
- ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟਣਾ, ਨਬਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ
- ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ: ਲਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ, ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਮੁਆਦ ਵਗਣਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦਿਓ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ? How to decrease your risk of infection?

ਕੱਟ ਅਤੇ ਝਰੀਟਾਂ: Cuts and scrapes: ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਮੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਚਮੜੀ ਕਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ (ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੁਖਣਾ, ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਪਸ/ਪਾਕ ਅਤੇ ਦਰਦ)। ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ, ਛਾਲੇ, ਗੰਢਾਂ/ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੱਢਾਂ, ਕਮਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੱਥ ਧੋਣੇ: Hand washing: ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘਬਰਾਰ ਬਾਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਪਿਸਾਬ ਵਾਲੇ ਕੈਖੇਟਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਬਾਬਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ।

ਸੰਪਰਕ: Contacts: ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ (ਜੁਕਾਮ, ਫਲੂ) ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ, ਕੱਪ, ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੁੱਖਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਉਸਤਰਾ ਵਰੈਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪਾਲਤੂ: Pets: ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਢੂਕੂੰਮੇ ਦੇ ਤਲਾਅ, ਬਿਲੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਬਾਗਬਾਨੀ: Gardening: ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਘਬਰਾਰ ਬਾਰ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ।

ਤਰਨਾ: Swimming: ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਰੀਨੇਟਿਡ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਅ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ (ਮਹਾਂਸਾਗਰ, ਸਮੁੰਦਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਭੀਲਾਂ) ਵਿਚ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜੰਤਾ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਟੱਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੰਘਾਓ।

ਕਾਮੁਕ ਸਰਗਰਮੀ: Sexual activity: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਕਰੋ, ਨਿਰੋਧ ਵਰਤੋ।

ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

BACTERIAL INFECTION

ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? What is a bacterial infection?

ਬੈਕਟੀਰੀਏ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਲਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਨੋਟ: ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ)।

ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? How is it treated?

ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ “ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ” ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਫੰਗਲ ਇਨੈਕਸ਼ਨ

FUNGAL INFECTION

ਫੰਗਲ ਇਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? What is a fungal infection?

ਇਹ ਫੰਗਸ (ਉੱਲੀ) ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੰਗਸ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

- ਨਿਊਮੋਸਿਸਟਿਸ ਕਾਰਿਨੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊਮੋਸਿਸਟਿਸ ਜਿਰੋਵੇਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)
- ਕੈਂਡੀਡਾ
- ਐਸਪਰਜਿਲਸ

ਨਿਊਮੋਸਿਸਟਿਸ ਕਾਰਿਨੀ ਨਿਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਮੋਸਿਸਟਿਸ ਜਿਰੋਵੇਸੀ ਨਿਮੋਨੀਆ

PCP (Pneumocystis carinii pneumonia) or PJP (Pneumocystis jirovecii pneumonia)

ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੰਗਲ ਇਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਇਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਇਨੈਕਟਿਵ ਦਵਾਈ ਸਲਫਾਮੀਥੋਕਸਾਜ਼ੋਲ/ਟਰਾਈਮੀਥੋਪ੍ਰਿਮ (ਸੈਪਟਰਾ, ਬੈਂਕਟਿਮ, ਸਲਫਾਟਿਮ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਲਫਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਕੈਂਡੀਡਾ Candida

ਕੈਂਡੀਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਬਹੁਤ ਆਮ ਇਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥਰੱਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਥਰੱਸ਼ ਮੂੰਹ ਦੀ ਇਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੀਭ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਅੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰੱਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਓਰਲ ਤਰਲ ਨਿਸਟਾਟਿਨ (nystatin) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਂਡੀਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਫਲੂਕੋਨਾਜ਼ੋਲ (fluconazole) ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਸਪਰਜਿਲਸ Aspergillus

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੰਗਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਟ੍ਰੈਕਟ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾੜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਓਰਲ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਰੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ, ਐਂਡੋਟੇਰੀਸਿਨ ਬੀ.) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।


SULFAMETHOXAZOLE/TRIMETHOPRIM

ਸਲਫਾਮੀਬੋਕਸਾਜ਼ੋਲ/ਟਰਾਈਮੀਬੋਪਰਿਮ

- ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਪਟਰਾ®, ਸਲਫਾਟਰਿਮ®, ਬੈਕਟਰਿਮ®, ਕੋਟਰੀਮੋਕਸਾਜ਼ੋਲ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਤਰਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? What does the medication look like?

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਚਿੱਤਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।



ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? What is this medication for?

ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਤ ਐਂਟੀਬਾਈਟਿਕ ਹੈ ਜੋ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੇਵਾਇਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ PCP ਜਾਂ PJP ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ) ਨੂੰ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? How should I take this medication?

ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵੇ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ)	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ: _____
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 3 ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਾਰ:

- ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲਵੋ।
- ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨੇ ਰੁਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ : ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਲਫਾ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਫਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: Missed Dose or Vomited Dose:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਵੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੇ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਢੁਬਾਰਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਵੇ।

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? What are some possible side effects of this medication?

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Side Effect	ਇਲਾਜ Management
ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ	ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਪਰੋਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।
ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ	ਜੇ ਲੱਛਣ ਪਰੋਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।
ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ	ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਟੋਪੀ ਪਾਓ, ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਲੰਮੀ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਸਕਰਟ ਪਹਿਨੋ। ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ 30 SPF ਵਾਲਾ ਲੋਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਓ।
ਚਮੜੀ ਤੇ ਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਖਾਰਸ	ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

ੜਗੀਓਲ ਵਿਡੋਖਸ਼ਾਂ

VIRAL INFECTION

ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? What is a viral infection?

ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- ਸਾਈਟੋਮੇਗਲੋਵਾਇਰਸ {Cytomegalovirus (CMV)}
- ਬੀ.ਕੇ. ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ. ਵਾਇਰਸ {BK Virus (BKV) and JC Virus (JCV)}
- ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਬੀ. ਅਤੇ ਸੀ. {Hepatitis B and C}

ਸਾਈਟੋਮੇਗਲੋਵਾਇਰਸ Cytomegalovirus (CMV)

ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਈਟੋਮੇਗਲੋਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟੋਮੇਗਲੋਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਿਸ ਅੰਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਥਕਾਵਟ, ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰਦਰਦ, ਦਸਤ, ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਫੱਲਣਾ।

ਬੀ.ਕੇ. ਵਾਇਰਸ BK Virus

ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਕੇ. ਵਾਇਰਸ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਬੀ.ਕੇ. ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਬੀ. ਅਤੇ ਸੀ. Hepatitis B and C

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ (ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਲਈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਬੀ. ਜਾਂ ਸੀ. ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰੇਗੀ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।


VALGANCICLOVIR

ਵਲਗੰਸੀਕਲੋਵੀਰ

- ਇਸ ਨੂੰ ਵਲਸਾਈਟ®, ਅਪੋ-ਵਲਗੰਸੀਕਲੋਵੀਰ®, ਔਰੋ-ਵਲਗੰਸੀਕਲੋਵਰ® ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਤਰਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? What does the medication look like?

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।



ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? What is this medication for?

ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਕਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਲਈ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਸਾਈਟੋਮੇਗਲੋਵਾਇਰਸ) [CMV ((Cytomegalovirus)] ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? How should I take this medication?

ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵੇ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ)	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ: _____
ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲਵੇ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ)	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ: _____

- ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜਬ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲਵੇ।

ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: Missed Dose or Vomited Dose:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਵੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੇ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਵੇ।

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? What are some possible side effects of this medication?

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Side Effect	ਇਲਾਜ Management
ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ	ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਵਲਗੰਸੀਕਲੋਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਨ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਕਣ, ਲਾਲ ਕਣ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਝੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।	ਝੂਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ: <ul style="list-style-type: none"> ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ, ਖੰਘ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ। ਝੂਨ ਵਗਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਗੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਾਲੀ ਟੱਟੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਵਿਚ ਝੂਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਝੂਨ। ਝੂਨ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਣਾਂ ਦੇ ਘਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਥਕਾਨ, ਬੋਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।

VALACYCLOVIR

ਵਲਸਾਈਕਲੋਵੀਰ

- ਇਹ ਵਲਟਰੈਕਸ® ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? What does the medication look like?

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਬਰਾਂਡ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਏ ਚਿੱਤਰ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।



ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? What is this medication for?

ਇਹ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅੰਗ ਬਦਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਪੀਜ਼, ਖਸਰਾ, ਸਿੰਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸੋਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? How should I take this medication?

ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵੇ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ)	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਬੀਮ: _____
ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲਵੇ (ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਰੋਜ਼ 9 ਵਜੇ ਸੁਭਾ ਅਤੇ 9 ਵਜੇ ਰਾਤ)	ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਾਬੀਮ: _____

- ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਦਿਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਗੀਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਲਵੇ।

ਖੁਰਾਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ: Missed Dose or Vomited Dose:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਵੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਵੇ।

ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈ ਉਲਟੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਵੇ।

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹਨ? What are some possible side effects of this medication?

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ Side Effect	ਇਲਾਜ Management
ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ	ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸੋ।
ਸਿਰ ਦਰਦ	ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

OVER-THE-COUNTER (OTC) MEDICATIONS

ਇਹ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਰਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ (ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ)। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਲੱਛਣ	ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ (ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ)	ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਐਲਰਜੀ	Benadryl® (Diphenhydramine)	
	Chlortripolon® (Chlorpheniramine)	
	Claritin® (Loratadine)	
	Reactine® (Cetirizine)	
	Allegra® (Fexofenadine)	
	Aerius ® (Desloratadine)	
ਛਾਤੀ ਜੰਮਣੀ	Otrivin ® (Xylometazoline)	ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
	Dristan® (Oxymetazoline)	ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਡੀਕੰਜੈਸਟੈਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੋਜ਼ ਕਰੋ।
ਖੰਘ	Benylin® DM (Dextromethorphan)	ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
	Benylin® DM-D (Dextromethorphan-Pseudoephedrine)	ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਡੀਕੰਜੈਸਟੈਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੋਜ਼ ਕਰੋ।
	Benylin® DM-DE (Dextromethorphan-pseudoephedrine-guaifenesin)	

ਲੱਛਣ	ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ (ਸਰਗਰਮ ਤੱਤ)	ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਦਸਤ	ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਦਸੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।	ਇਮੋਡੀਅਮ (IMODIUM) – ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ		Gravol® (Dimenhydrinate)
		ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਦਸੋ।
ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ	Tylenol® (Acetaminophen)	ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਸਟੀਰੀਅਂਡਲ ਐਂਟੀ- ਇਨਫਲਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਈਬੁਫੇਨ (ਐਡਵਿਲ® ਅਤੇ ਮੌਰਿਨ®), ਨੈਪਰੋਕਸੇਨ (ਐਲੇਵੇ® ਅਤੇ ਨੈਪਰੋਸਿਨ®), ਏ.ਐੱਸ.ਏ. ਜਾਂ ਐਸਪਰੀਨ® ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਸਟਰੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 81 ਮਿ.ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਬੇਬੀ ਐਸਪਰੀਨ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਮਰ ਵਿਚ ਦਰਦ	Robaxin® (Methocarbamol)	
	Robaxacet® (Methocarbamol- acetaminophen)	

ਨੇਚੁਰੋਪੈਥਿਕ, ਹਰਬਲ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਂ ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਪਦਾਰਥ

NATUROPATHIC, HERBAL, TRADITIONAL OR HOMEOPATHIC PRODUCTS

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚੁਰੋਪੈਥਿਕ, ਹਰਬਲ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਂ ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲਵੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤੇਜਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਬਹੁਤ ਆਸ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ:

ਪਦਾਰਥ	ਸੁਰੱਖਿਆ	ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਈਚਿਨੀਸੀਆ (Echinacea) (Echinacea purpurea)	ਇਹ ਸੰਪੂਰਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।	
ਲਸਣ Garlic (Allium sativum)	ਬਹੁਤ ਗਾੜ੍ਹਾ ਲਸਣ ਸੰਪੂਰਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਸਣ ਦੀ ਸੰਪੂਰਕ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਲਸਣ ਅਤਿਅੰਤ ਗਾੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।	ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਲਸਣ ਖਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਅਦਰਕ Ginger	ਅਦਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।	ਅਦਰਕ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਅਦਰਕ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਗਾੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਲ ਕਿਸਮ ਨਾ ਲਵੋ।

ਪਦਾਰਥ	ਸੁਰੱਖਿਆ	ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਿੰਕਗੋ (ਜਿੰਕਗੋ ਬਿਲੋਬਾ) Ginkgo (Ginkgo biloba)	ਇਸ ਸੰਪੂਰਕ ਨਾਲ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।	
ਮਰੀਜ਼ਾਨਾ Marijuana (THC/CBD)	ਮਰੀਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਮੈਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਵਡਿਆਂ ਵਿਚ ਐਪਰਜੀਲਸ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਫੰਗਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।	ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵੈਂਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: http://www.transplant.bc.ca/transplant-and-medications/general-medication
ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ (Melatonin)	ਇਸ ਸੰਪੂਰਕ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਖੁਰਾਕ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਕ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੇ।	
ਪ੍ਰੋਬਿਆਟਿਕਸ (ਦਹੀਂ ਜਿਹੇ ਖਮੀਰੇ ਪਦਾਰਥ) (Probiotics)	ਖਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਪੂਰਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ (ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ) ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਨੀਂਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।	ਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਦਿਯੋਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬਿਆਟਿਕ/ਖਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਲੇਬਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਸੇਂਟ ਜੋਹਨ ਵਾਰਟ St. John's Wort	ਇਹ ਸੰਪੂਰਕ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਮਿਊਨੋਸੁਪਰੈਸਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਟੈਕਰੋਲਿਮਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰੀਨ ਨਾਲ ਪਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।	

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ

CANCER RISK

ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਹਨ:

- ਲਿੰਫੋਮਾ (ਖੂਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਫੋਪੋਲਾਈਫਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
- ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਹ (ਸਰਵਿਕਸ) ਦਾ ਕੈਂਸਰ
- ਪਾਚਨ ਮਾਰਗ/ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ

ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਲ.ਡੀ. (PTLD) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਰੋਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਿਕਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (Cancer of the cervix) ਔਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਂਸਟ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਸਟ ਨਾਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੈਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਚਨ ਮਾਰਗ/ਟਰੈਕਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (Digestive tract cancer) ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੱਟੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਖੂਨ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਦਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਟੀਨ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ (ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਰੇ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟੀਕੁਲਰ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਟੈਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਸਟੈਟ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ Skin Cancers

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਹਨ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

- ਐਸ.ਪੀ.ਐਂਡ. 30 ਜਾਂ ਵਧ ਵਾਲੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਵਰਤੋ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲ੍ਹ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ)। ਤਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਓ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਵਰਤੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧੁੱਪੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਸਕੀਂਗ ਲਈ)।
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਹੋ ਤਾਂ ਟੋਪ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹੋਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਪੈਂਟ ਪਹਿਨੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਯੂ.ਵੀ. ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨੇ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੌਰਾਨ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਠੰਡੇ, ਬਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਹਿਰੇ ਬਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ 70-80% ਯੂ.ਵੀ. ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਤਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
- ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੇ ਉਤਰਨੇ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ/ਸੇਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਸ ਜਾਂ ਮੁਆਦ ਨਿਕਲਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
- ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
 - 1 ਚਮਚ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਮੂੰਹ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਧੋਣ ਤੇ ਲਗਾਓ;
 - 2 ਚਮਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਓ;
 - 1 ਚਮਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲਗਾਓ;
 - 2 ਚਮਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਟ, ਲੱਤ ਅਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ

VACCINATIONS FOR SOLID ORGAN TRANSPLANT RECIPIENTS

ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਂਟੀ-ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਚਾ ਬੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵੈਂਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: <http://www.transplant.bc.ca/transplant-and-medications/general-medication/vaccination-after-transplant>